

Применение пептидных
биорегуляторов в сочетании с
мануальной терапией при
натальных травмах шейного отдела
позвоночника
(клинический случай)

Громницкий Андрей Васильевич (г.Москва)

* Актуальность

- Родовые травмы нервной системы являются самым распространенным «Народным заболеванием» (М.Д. Гютнер 1945 г)
- По данным кафедры детской неврологии Казанского ГИДУВа на 2005 год 85% процентов новорожденных детей имеют родовые травмы с церебральной и спинальной локализацией очага повреждения
- Еще 1956 С.А. Фрайманом было доказано негативные последствия ручных пособий в родах. Путём отказа от них процент таких травм как кефалогематома, асфиксия, внутричерепные кровоизлияния, мертворождаемость снизились в среднем в 4 раза

* Диагноз, поставленный в роддоме

Ребенок П.. д.р. 6.7.2014 год, от первой беременности, первые роды срочные, самопроизвольные. В сроке 41 неделя, головное предлежание.

Масса 3600, длина 55 см, окружность головы 35 см, окружность груди 35 см, пол женский, оценка Апгар 1-3 балла.

Состояние тяжелое, обусловленное тяжелой асфиксией и неонатальными судорогами.

Судорожный синдром дыхательной недостаточности 3 степени.

На 15 сутки снята с аппаратной ИВЛ, переведена в отделение патологии новорожденных с диагнозом церебральная ишемия 2 степени, синдром угнетения ЦНС и судорожный синдром в анамнезе.

* Диагноз на момент поступления

Прием детского невролога в 5 месяцев.

Жалобы: голову не держит, на локти не опирается, не переворачивается, ест во сне, при глотании днем возбуждение (машет руками).

Объективно: резко снижен тонус, общая гипотония на фоне внутричерепной гидроцефалии, псевдобульбарный синдром под вопросом, синдром двигательных нарушений.

УЗИ 2.12.14 : ЭХО графические признаки симметричной вендрикуломегалии средней степени выраженности, асимметрия субарахноидального пространства на фоне дилатации слева, единичная киста левого сосудистого сплетения.

МРТ 4.12.14: симметричное изменение подкорковых ядер обоих полушарий.

*Проводимая терапия

В 7 месяцев у ребенка начат курс пептидных биорегуляторов:

- ✓ Препарат NeyRapid Nr.11 фирмы VitOrgan в разведениях D7 и D4

Схема применения: две упаковки D7 кололись в/м 5 дней подряд
2 дня перерыв, далее
5 упаковок D4 каждый третий день.



- ✓ На момент приема пептидного препарата и клинически значимых изменений проводилась поэтапная мануальная терапия.

*Результат проводимой комплексной терапии

За прошедшие 6 месяцев

- ✓ Ребенок приобрел последовательно необходимые навыки, которые здоровый ребенок приобретает до года;
- ✓ Ребенок стал держать голову, переворачиваться, вставать на четвереньки, ползать, садиться и встал на ноги у опоры;
- ✓ Со стороны психоэмоциональной сферы ребенок соответствует 9 месяцам развития, что так же является положительной динамикой.

*Схема комплексной терапии на данный момент

- ✓ Мануальная терапия продолжается;
- ✓ Месяц назад начат повторный курс из двух биорегуляторов NeyRapid Nr.11 и NayFoc Nr. 69, рассчитанный на 3,5 мес



Спасибо за внимание!

Врач педиатр-невролог Громницкий Андрей Васильевич

тел.: 8(495) 519-77-16

mail:rombobro@yandex.ru

Детский семейный медцентр “Драгоценность”

www.драгоценность.рф

г.Москва, Малый Левшинский переулок дом 7 строение 2